

¿Viajas a América de Sur?

Esto te interesa

¿Qué es la fiebre amarilla?

La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda transmitida por mosquitos. Puede variar desde síntomas leves (fiebre, dolor de cabeza, cansancio) hasta una forma grave con complicaciones hemorrágicas y fallo de órganos.

¿Cómo se transmite?

- Picadura de mosquitos del bosque (*Haemagogus*, *Sabethes*) o urbanos (*Aedes aegypti*).
- No existe transmisión directa de persona a persona.

Síntomas principales

1. Fiebre alta (38°C o mayor)
2. Dolor de cabeza y muscular
3. Náuseas, vómitos
4. Ictericia (color amarillento de piel y ojos)
5. Sangrados en casos graves

Los primeros síntomas suelen aparecer de 3 a 6 días después de la picadura del mosquito.

¿Dónde hay riesgo?

- La fiebre amarilla está presente de forma natural en 12 países y un territorio de las Américas: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela.
- **En 2025**, entre las semanas epidemiológicas 1 y 20, se confirmaron **221 casos** en humanos y **89 fallecimientos** en cinco países: **Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.**

Si viajas a alguno de esos países sigue estos consejos:

Protección total

1 Vacunación

Es la forma más efectiva de protección. Dosis única, con inmunidad $\geq 99\%$ a partir de los 10 días.

2 Lleva tu Certificado

¡No olvides tu Certificado Internacional de Vacunación!

Evita los mosquitos

1 Usa repelente

Aplica repelente de amplio espectro (DEET, picaridina).

2 Cúbrete

Viste ropa de manga larga y pantalones largos.

3 Protege tu hogar

Emplea mosquiteros y mantén ventanas con malla.

Prepárate para tu viaje

1. Consulta con un profesional de salud al menos **4–6 semanas antes** de viajar.
2. Vacúnate con anticipación, ya que la inmunidad se desarrolla **hasta 10 días después de aplicada la vacuna**, y solicita tu certificado.
3. Infórmate sobre requisitos de entrada: algunos países exigen certificado de vacunación.

¿Qué hacer si presentas síntomas?

- Si desarrollas fiebre, dolor de cabeza intenso, tus ojos o piel tienen coloración amarilla dentro de las **3–14 días** posteriores al viaje, **busca atención médica inmediata**.
- Informa a tu médico sobre tu viaje a zonas con riesgo de fiebre amarilla.

Contacto y más información

- Sitio OMS/OPS: [**2025-abril-24-phe-actualizacion-epidemiologica-fiebre-amarilla-final.pdf**](#)
- Clínica del viajero: [**Clínica del Viajero, UNAM – Viajar vacunado es viajar seguro**](#)
- En caso de urgencia sanitaria, acude al centro médico más cercano.

¡Viaja seguro y protégete contra la fiebre amarilla!